

TRITTICO[®] retard

Trazodon







Zur Behandlung von
Depressionen mit
oder ohne **Angst-**
und Schlafstörungen
bei Erwachsenen.




ANGELINI

DOSIERUNGSTABELLE 150 mg

	Dosierung	Wirkung
1. bis 3. Tag	50 mg abends (= 1/3 d. Tablette) 	Verbesserung der Schlafqualität
4. bis 6. Tag	100 mg abends (= 2/3 d. Tablette) ¹ 	Angstlösende Wirkung
7. bis 14. Tag	150 mg abends (= 1 Tablette) 	Antidepressive Wirkung
Ab dem 15. Tag	Dosis beibehalten oder bis zu 300 mg steigern (≤ 2 Tabletten) 	



Maximale Tagesdosis: ambulant 400 mg, stationär 600 mg pro Tag

* Bei höherer Dosierung (> 200 mg): Aufteilung: abends und morgens

1 Stahl. 2009. Mechanism of Action of Trazodone: a Multifunctional Drug. CNS Spectr, 14 (10): 536-546.

Fachkurzinformation: TRITTICO® retard 75 mg – Tabletten und TRITTICO® retard 150 mg – Tabletten.
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: TRITTICO® retard 75 mg – Tabletten: eine Tablette enthält 75 mg Trazodonhydrochlorid. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Saccharose 42 mg pro Tablette. TRITTICO® retard 150 mg – Tabletten: eine Tablette enthält 150 mg Trazodonhydrochlorid. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Saccharose 84 mg pro Tablette. **Liste der sonstigen Bestandteile:** TRITTICO® retard 75 mg – Tabletten und TRITTICO® retard 150 mg – Tabletten: Saccharose, Polyvinylpyrrolidon, Carnaubawachs, Magnesiumstearat. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von depressiven Erkrankungen mit oder ohne Angstkomponente oder Schlafstörungen. Trittico wird angewendet bei Erwachsenen (ab 18 Jahren). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Alkoholvergiftung und Intoxikation mit Hypnotika, akuter Myokardinfarkt. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Psychoanaleptika, Antidepressiva, Trazodon. **ATC-Code:** N06AX05. **Inhaber der Zulassung:** Angelini Pharma Österreich GmbH, 1200 Wien. **Stand der Information:** Jänner 2017. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**